

HER2陽性

類型	藥名 (字名/商標名)	給藥途徑	副作用	注意事項
HER2陽性	Trastuzumab, Herceptin, 賀癌平	靜脈注射 皮下注射	過敏反應、血球減少、心肌病變、間質性肺炎、肌肉關節疼痛、皮膚疹	1.觀察過敏反應。 2.追蹤心臟功能。 3.合併使用賀疾妥。 4.血液學檢查。
HER2陽性	Pertuzumab, Perjeta 賀疾妥	靜脈注射	心臟功能受損、噁心、嘔吐、白血球下降、掉髮	1.預防感染 2.追蹤心臟功能。 3.合併使用賀癌平 4.血液學檢查
HER2陽性	Phesgo, 賀雙妥	皮下注射	心臟功能受損、噁心、嘔吐、白血球下降、掉髮	1.賀疾妥與賀癌平組合靜脈劑。
HER2陽性	Lapatinib, Tykerb 泰嘉錠	口服	腹瀉、噁心、嘔吐、紅疹、手足症候群、皮膚疹、肝功能異常	1.口腔照護。 2.請勿並用葡萄柚 3.觀察腹瀉情形。 4.皮膚照護。 5.整顆吞服。 6.容易與其他藥物有交互作用。
ADC藥物	T-DM1, Kadcyla 賀癌寧	靜脈注射	過敏反應、血小板減少、噁心、便秘、神經損傷、肝臟毒性	1.賀癌平與化療藥物（DM1）合併的藥物 2.血液學檢查，觀察出血症狀。
ADC藥物	Trastuzumab Deruxtecan, Enhertu, TDxd, 優赫得	靜脈注射	心臟功能受損、噁心、嘔吐、掉髮、便秘、血球減少(白血球、貧血)、腹瀉、間質性肺炎	1.預防感染 2.血液學檢查 3.觀察呼吸狀況 4.追蹤心臟功能。
酪氨酸激酶抑制劑	Neratinib, 賀利安	口服	腹瀉、噁心、腹痛、疲倦、嘔吐、皮疹、口腔黏膜炎	1.觀察腹瀉情形。
酪氨酸激酶抑制劑	Tucatinib	口服	腹瀉、噁心、手足症候群、肝指數上升、疲倦、皮疹、口腔黏膜炎	1.觀察腹瀉情形。 2.追蹤肝指數

製表／台灣癌症基金會

賀爾蒙接受體陽性

類型	藥名 (學名/商品名)	給藥途徑	副作用	注意事項
CDK 4/6 抑制劑	Albociclib, Ibrance 愛乳適	口服	全血球下降(白血球下降及貧血明顯)、疲倦、噁心、腹瀉	1.隨餐服用 2.有半乳糖不耐症禁用 3.不可與葡萄柚併用 4.服用三週，休息一週 5.血液學檢查
CDK 4/6 抑陽性	Ibociclib, Kisqali 擊癌利	口服	白血球降低、貧血、倦怠、腹瀉、肝功能異常、心電圖異常	1.不可與葡萄柚併用 2.血液學檢查 3.追蹤心臟功能 4.追蹤肝指數
CDK 4/6 抑制劑	Abemaciclib, Verzenio 捷癌寧	口服	貧血、腹瀉(常見)、倦怠、掉髮	1.觀察腹瀉情形 2.追蹤肝指數
mTOR	Everolimus, Afinitor, 癌伏妥	口服	血球減少、皮疹、腹瀉、口腔黏膜炎、間質性肺炎	1.不可與葡萄柚併用 2.觀察呼吸情況
PI3K 基因突變	Alpelisib Picray 愛克利	口服	高血糖、皮膚反應、腹瀉、噁心、嘔吐、口腔黏膜炎、掉髮、疲倦。	1.與食物併服 2.追蹤血糖變化 3.觀察皮膚變化

製表/台灣癌症基金會

三陰性

類型	藥名 (學名/商品名)	給藥途徑	副作用	注意事項
PARP抑制劑	Olaparib 令癌莎	口服	血球低下(貧血較明顯)、疲倦、噁心、嘔吐、腹瀉。	1.血液學檢查 2.觀察腹瀉情形
PARP 抑制劑	Talazoparib, Talzenna, 達勝癌	口服	血球低下(貧血較明顯)、疲倦、噁心、頭痛、嘔吐、脫髮、腹瀉	1.血液學檢查 2.觀察血糖及血壓變化 3.觀察腹瀉情形
血管 新生 抑制劑	Bevacizumab 癌思婷	靜脈注射	高血壓、蛋白尿、腸胃出血、流鼻血、血管栓塞。	1.觀察出血症狀(咳血、解黑便、皮膚不明瘀青、粘膜出血等症狀) 2.蛋白尿(尿液泡沫多，久久不散)
ADC藥物	Trodely	靜脈注射	血球低下(白血球、貧血)、噁心、腹瀉、脫法、皮膚疹	1.血液學檢查 2.觀察腹瀉情形

製表/台灣癌症基金會

其他標的藥物

NTRK基因融合陽性	Entrectinib, Rozlytrek, 羅思克	口服	頭暈、低血壓、疲倦、心跳不規則、便秘或腹瀉、認知障礙、肝指數上升、尿酸上升、水腫、貧血、皮膚疹	1.觀察皮膚狀態 2.觀察腹瀉情形 3.追蹤肝指數 4.追蹤心臟
------------	-----------------------------------	----	---	---