

藥物 (學名/商品名)	途徑	副作用	注意事項
Cytarabine, Ara-C, 賽德薩	靜脈注射	全血球低下、噁心、嘔吐、黏膜炎、食慾不振、結膜炎、腹瀉、掉髮、肝功能異常、皮膚疹。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。 4. 監測肝功能。
Cyclophosphamide Endoxan, 癌得星	靜脈注射	全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、掉髮、出血性膀胱炎、肝功能異常、腎毒性、末梢皮膚顏色沉著。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察排尿狀況。 4. 補充足夠水分。
Clofarabine, Evoltra, 宜保安	靜脈注射	全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、腹瀉、腎毒性。 *21歲以下使用	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察排尿狀況。 4. 補充足夠水分。
Daunoblastina, Daunorubicin, 唐黴素	靜脈注射	全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、掉髮、過敏、心臟毒性。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 監測心臟功能。 4. 口腔照護。
Doxorubicin, Adriamycin, 小紅莓	靜脈注射	全血球低下、噁心、嘔吐、掉髮、腹瀉、口腔黏膜炎、尿液變紅約1~2天、心臟毒性、過敏、結膜炎	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。 4. 追蹤心臟功能。
Etoposide 滅必治	靜脈注射	低血壓(輸注太快引起)、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、掉髮、肝功能異常、過敏。	1. 觀察血壓變化。 2. 監測肝功能。
Fludarabine 福達樂	靜脈注射	全血球低下、黏膜炎、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、史蒂芬強生症候群(少見但嚴重)、進行性多發性腦白質病變、視覺異常、癲癇、過敏。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。
L-Asparaginase, Leunase 樂拿舒	靜脈注射	過敏性休克(需先做小劑量的過敏測試)、胰臟炎(劇烈腹痛)、噁心、嘔吐、發燒)、高血糖、腸胃不適、腹痛、凝血功能異常。	1. 注射前低劑量測試。 2. 血液學檢查。 3. 預防感染。 4. 觀察胰臟炎症狀。 5. 追蹤血糖變化。
Methotrexate, MTX, 每索特	注射口服	全血球低下、黏膜炎、肝功能異常、腎毒性、掉髮、發燒、腹瀉、腹痛等。備註：使用中、高劑量要監測血中藥物濃度與肝功能，並定時給予葉酸作為解毒劑。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。 4. 含葉酸的補充劑會影響藥效，避免未經醫療指示隨意服藥。
Mitoxantrone, Novantrone, 能滅瘤	靜脈注射	全血球低下、噁心、嘔吐、掉髮、腹瀉、口腔黏膜炎、尿液變藍綠色約1~2天、心臟毒性、肝功能異常。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。 4. 追蹤心臟功能。
Nelarabine, Arranon	靜脈注射	全血球低下、神經毒性、嗜睡、頭暈、噁心、嘔吐。 *適用於T細胞-ALL。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察意識、監測神經毒性。
Pegaspargase, Oncaspa,	靜脈注射	過敏性休克、白血球降低、胰臟炎、低蛋白血症、噁心、高血糖、凝血功能異常、血栓風險、肝功能異常、三酸甘油酯上升。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察意識、監測神經毒性。
Vincristine 文克斯汀	靜脈注射	腹痛、便秘、掉髮、神經毒性(麻木、刺痛、感覺異常、運動困難、排尿異常等)、頭痛、視力減弱等。	1. 觀察神經學副作用。 2. 補充足夠水分。 3. 觀察神經毒性副作用

<p>6-mercaptoprine, 6-MP 美克多能錠</p>	<p>口服</p>	<p>全血球低下、色素沈著、皮疹、腹瀉、高尿酸血症、胰臟炎、肝功能異常。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察胰臟炎症狀
<p>類固醇</p>	<p>注射 口服</p>	<p>食慾不振、胃潰瘍、高血糖、睡眠障礙、毛囊炎。 高劑量或長期使用：外觀改變、月亮臉、水牛肩、青春痘、骨質疏鬆、皮膚變薄、容易感染等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不同治療期使用不同種類的類固醇。 2. 預防感染 3. 避免空腹服用。 4. 嚴重胃痛、解黑便或血便、發燒須就醫。