

類型	藥物 (學名/商品名)	途徑	副作用	注意事項
抗CD22	Inotuzumab ozogamicin, Bes+B3:E28ponosa, 沛斯博	注射	血球低下、腹痛、噁心、頭痛、 感染、肝臟毒性(肝靜脈阻塞疾 病)。如有發燒、黃疸、心臟功 能異常。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 監測心臟功能。 4. 肝功能檢查·觀察有無腹痛、黃疸。
抗CD20	Rituximab, Mabthera, 莫須瘤	靜脈	輸注過敏反應、淋巴球低下、B 型肝炎病毒再活化、頭痛。	1. 血液學檢查。 2. 預防感染 3. 觀察過敏反應。 4. B型肝炎者追蹤病毒量及肝指數。
酪胺酸激酶抑制劑 (TKI) *用於費城染色體 + B3:E28陽性患者	Imatinib, Glivec, 基利克	口服	水腫(眼眶、肢體、心包膜或肋 膜積水)、噁心、嘔吐、腹瀉、 皮疹、血球低下、肌肉痠痛、肌 肉痙攣、膚色變白等	1. 血液學檢查 2. 測量體重·觀察水腫情形 3. 藥物交互作用。 4. 餐中服用。
	Dasatinib, Sprycel, 柏萊	口服	水腫(眼眶、肢體、心包膜或肋 膜積水)、噁心、嘔吐、腹瀉、 皮疹、血球低下(血小板)、心臟 功能異常。	1. 血液學檢查 2. 測量體重·觀察水腫情形 3. 監測心臟功能。 4. 整顆服用·勿切割或磨粉
	Nilotinib, Tasigna, 泰息安	口服	皮疹、噁心、心臟功能異常、肝 臟毒性、頭痛、血糖上升、血球 低下、低血鉀、低血鎂等。	1. 血液學檢查(包含電解質) 2. 預防感染。 3. 監測心臟功能。 4. 服藥前·空腹兩小時；服藥後·空腹一小時。
	Ponatinib, Iclusig, 英可欣	口服	動脈或靜脈栓塞、心臟功能異 常、肝臟毒性、高血壓、胰臟 炎、血球低下(血小板)、便秘 等。	1. 血液學檢查 2. 預防感染 3. 觀察疑似血栓症狀·如胸痛、呼吸喘、單側無力、言語障 礙、腿部疼痛或腿部腫脹·立即就醫。
	Bosutinib, Bosulif	口服	嘔吐、腹瀉、腹痛、肝指數上升 等。	1. 血液學檢查 2. 預防感染 3. 監測肝功能。