

| 藥物 | 途徑 | 副作用 | 注意事項 |
|--|----|--|---|
| Bleomycin, 撲類惡 | 靜脈 | 間質性肺炎和肺纖維化等嚴重肺病、噁心、嘔吐、掉髮、過敏、皮膚顏色沉著。 | 1. 觀察呼吸狀態，有出現發燒、咳嗽或活動時呼吸困難，立即就醫且考慮停藥。尤其是曾有肺部疾病、胸部有接受或曾接受放射治療者更需注意。 2. 首次注射觀察過敏反應。 3. 血液學檢查。 4. 預防感染。 |
| Cisplatin, Kemoplat, 順鉑、鉑金 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、食慾不振、腎功能受損、耳鳴、聽力受損、末梢神經病變(手、腳麻木感) | 1. 血液學檢查 2. 預防感染。 3. 補充足夠水分。 4. 注意聽力變化，聽力檢查 |
| Carboplatin, Kemocarb, 卡鉑 | 靜脈 | 血球低下(白血球、血小板較明顯)、噁心、嘔吐、食慾不振、腎功能受損、末梢神經病變(手、腳麻木感)、掉髮。 | 1. 血液學檢查 2. 預防感染。 3. 補充足夠水分。 4. 注意聽力變化，聽力檢查。 5. 過敏反應。 |
| Cyclophosphamide, Endoxan, 癌得星 | 靜脈 | 全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、掉髮、出血性膀胱炎、肝毒性、腎毒性、末梢皮膚顏色沉著。 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察排尿狀況。 4. 補充足夠水分。 |
| Doxorubicin, Adriamycin, 小紅莓、艾黴素 | 靜脈 | 全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、掉髮、過敏、心臟毒性、末梢皮膚顏色沉著。 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 監測心臟功能。 4. 補充足夠水分 |
| Docetaxel, Taxotere, 歐洲紫杉醇 | 靜脈 | 全血球減少、掉髮、口腔黏膜炎、噁心、嘔吐、體液滯留(水腫)、周邊神經病變、肌肉關節痛、手足症候群。 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 觀察周邊神經副作用(冰敷手掌、腳掌) 4. 口腔照護。 5. 皮膚照護。 |
| Epirubicin, 小紅莓 | 靜脈 | 全血球減少、噁心、嘔吐、掉髮、腹瀉、口腔黏膜炎、尿液變紅約1~2天、心臟毒性、過敏、結膜炎 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 口腔照護。 4. 追蹤心臟功能。 |
| Etoposide, 滅必治 | 靜脈 | 低血壓(輸注太快)、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、掉髮、肝功能異常、過敏。 | 1. 觀察血壓變化。 2. 監測肝功能。 3. 觀察注射期間過敏反應(發冷、心跳加快、呼吸困難、皮膚紅疹等) |
| Gemcitabine, Gemzar, 健擇 | 靜脈 | 血球低下、輕微噁心、嘔吐、掉髮、皮膚紅疹、周邊性水腫、類似感冒症狀(發燒、頭痛、發冷、肌肉痛) | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 |
| Ifosfamide, Holoxane, 好克癌 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、貧血、輕度尿蛋白、血尿、掉頭、皮膚疹、水腫 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 補充足夠水分。 4. 觀察排尿情形，困難解尿、頻尿或出血性膀胱炎的發生，需立即就醫。 |
| Liposomal Doxorubicin, LIPO-DOX, 力得微脂體 | 靜脈 | 血球低下、手足症候群(手脚腫脹、疼痛、感覺異常症狀)、急性過敏。 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 3. 手足症候群照護。 |
| Paclitaxel, Taxol, 太平洋紫杉醇 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、腹瀉、末梢神經病變(手、腳麻木感)、掉髮、肌肉痠痛、心跳變化、過敏反應。 | 1. 注意過敏反應。 2. 血液學檢查 3. 預防感染。 |
| Topotecan, 癌康定 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、掉髮、過敏反應。 | 1. 血液學檢查。 2. 預防感染。 |
| Fluorouracil, 5Fu, 好復 | 靜脈 | 口腔黏膜炎、腹瀉、嘔吐、皮膚色素沉著、手足症候群、血球低下、結膜炎、可逆性嗜睡、混亂、小腦運動失調等。 | 1. 口腔黏膜炎、食道炎。 2. 手足症候群照護。 |