

藥名 (學名/商品名)	給藥途徑	副作用	注意事項
CISPLATIN 順鉑	靜脈注射	噁心嘔吐、手腳麻刺的周邊神經病變、頭暈無力的低血鎂症、影響腎臟功能	1. 禁忌:對含鉑的合成物有嚴重過敏反應者、腎臟功能明顯異常者、聽力受損者、以及懷孕及哺乳婦女禁止使用。 2. 注意水分補充
CARBOPLATIN 卡鉑	靜脈注射	噁心嘔吐、手腳麻刺的周邊神經病變、頭暈無力的低血鎂症、血球減少、聽力降低、皮膚發疹	1. 禁忌:對含鉑的合成物有嚴重過敏反應者、腎臟功能明顯異常者以及懷孕及哺乳婦女禁止使用。 2. 應攝取足夠水份以防腎臟受損
Docetaxel Taxotere 剋瘍易	靜脈注射	虛弱、口腔炎、噁心和嘔吐, 以及腹瀉、肌肉疼痛、體液滯留及周邊水腫、掉髮	1. 禁忌:對此藥任何成分過敏者、懷孕及哺乳婦女 2. 血球低下, 注意自我保護, 預防感染 3. 易有過敏反應, 包括血管性水腫、皮疹、潮紅、發燒、低血壓、支氣管痙攣及呼吸困難, 須於注射前使用一些抗過敏用藥預防。
Fluorouracil 5-FU 好復	靜脈注射	口腔炎和食道炎(可能引起脫皮和潰瘍)、腹瀉、食慾減退、噁心、嘔吐	在下列情形下禁用: 1. 對本品過敏的患者 2. 營養不佳的狀態 3. 有嚴重骨髓功能抑制 4. 若有嚴重嘔吐、腹瀉、胃腸潰瘍、出血, 應即停用
Paclitaxel Taxol 汰癆勝	靜脈注射	骨髓抑制: 主要造成白血球數目的減少、噁心嘔吐、肌肉痠痛、手腳麻刺、掉髮、水腫、	1. 禁忌:對此藥任何成分過敏者、懷孕及哺乳婦女 2. 血球低下, 注意自我保護, 預防感染 3. 有時會引起心跳過敏, 低血壓。必要時需要做心電圖監測
Capecitabine (Xeloda) 截瘤達	口服	水腫、皮膚炎、便秘、腹瀉、腹痛、噁心嘔吐、食慾不振、貧血、白血球低下、血小板低下、高膽紅素血症、感覺異常、疲倦、手足症候群。	1. 飯後30分鐘使用, 宜整顆膠囊吞服, 勿剝開服用。 2. 若正在服用抗凝血劑warfarin, 須密切注意凝血功能。 3. 心臟毒性包含: 心肌梗塞、心絞痛、心律不整或心因性休克, 有重大心臟病者應謹慎使用。
Uracil-Tegafur UFT、UFUR 友復	口服	口炎、嘔吐、腹瀉腹痛、倦怠、厭食、皮膚發疹、心臟、肝臟或腎臟功能受損	1. 禁忌:對此藥任何成分過敏者、懷孕婦女。 2. 影響白血球計數, 需自我保護, 避免感染
Methotrexate MTX 每索特	靜脈注射	腸胃不適, 厭食, 倦怠, 潰瘍性口內炎, 骨髓抑制	1. 注意泛血球低下症狀, 避免感染。 2. 可能會產生光敏感反應, 病人應避免日曬太久。 3. 注意肝腎功能變化
Bleomycin 撲類惡	靜脈注射	發熱反應、厭食、噁心、嘔吐、腹瀉、體重下降、脫髮	1. 注意腎功能與肺功能之變化。 2. 具致畸胎性, 於治療期間應避免懷孕。