

| 藥物 (學名/商品名) | 途徑 | 副作用 | 注意事項 |
|-------------------------------------|------------|--|---|
| Doxorubicin, Adriamycin 小紅莓,艾黴素 | 靜脈 | 全血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、掉髮、過敏、心臟毒性、末梢皮膚顏色沉著。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.監測心臟功能。 4.補充足夠水分 |
| Bleomycin 撲類惡 | 靜脈 | 間質性肺炎和肺纖維化等嚴重肺病、噁心、嘔吐、掉髮、過敏、皮膚顏色沉著 | 1.觀察呼吸狀態，有出現發燒、咳嗽或活動時呼吸困難，立即就醫且考慮停藥。尤其是曾有肺部疾病、胸部有接受或曾接受放射治療者更需注意。 2.首次注射觀察過敏反應。 3.血液學檢查。 4.預防感染。 |
| Vinblastine DBL, 敏伯斯登 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、便秘或腹瀉、掉髮、末梢神經症狀、疼痛(骨頭、下頷及腫瘤部位)。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.觀察末梢神經症狀。 |
| Dacarbazine, DTIC 達卡巴仁 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、掉髮、類似感冒症狀(發燒、畏寒、疲倦、肌肉痛)、皮膚紅疹。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.出現類感冒症狀，觀察體溫跟症狀變化，因為與其他感染症狀相似。 |
| Bendamustine Innomustine, 普癌汰 | 靜脈 | 血球低下、凝血功能障礙、過敏、噁心、嘔吐、急性胰臟炎、皮膚不良反應、低鉀血症。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.觀察胰臟炎症狀(噁心、嘔吐、發燒、劇烈腹痛，常會傳到背部)。 4.使用心臟用藥者，注意低鉀與藥物的影響。 |
| Etoposide 滅必治 | 靜脈 | 低血壓(輸注太快)、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、掉髮、肝功能異常、過敏。 | 1.觀察血壓變化。 2.監測肝功能。 3.觀察注射期間過敏反應(發冷、心跳加快、呼吸困難、皮膚紅疹等) |
| Cyclophosphamide 癌德星 | 靜脈 | 血球低下、黏膜炎、噁心、嘔吐、出血性膀胱炎、掉髮、肝毒性、腎毒性、皮膚顏色沉著。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.觀察排尿狀況。 4.補充足夠水分。 |
| Vincristine 文克斯汀 | 靜脈 | 腹痛、便秘、掉髮、末梢神經毒性、頭痛、視力減弱等。 | 1.觀察神經學副作用。 2.觀察末梢神經症狀(麻木、刺痛、感覺異常、運動困難) |
| Cisplatin 順鉑、白金 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、食慾不振、腎功能受損、耳鳴、聽力受損、末梢神經病變、掉髮。 | 1.預防感染。 2.補充足夠水分。 3.注意聽力變化，聽力檢查。 4.觀察末梢神經症狀(麻木、刺痛、感覺異常、運動困難) |
| Carboplatin 卡鉑 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、食慾不振、末梢神經病變(手、腳麻木感)、過敏(注射一段療程後出現)、掉髮。 | 1.預防感染。 2.補充足夠水分。 3.觀察末梢神經症狀(手、腳麻木或刺痛感) 4.觀察注射期間過敏反應(發冷、心跳加快、呼吸困難、皮膚紅疹等) |
| Cytarabine 賽德薩 | 靜脈 | 全血球低下、噁心、嘔吐、黏膜炎、食慾不振、結膜炎、腹瀉、掉髮、肝功能異常、皮膚疹。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.口腔照護。 4.監測肝功能。 |
| Ifosfamide, Holoxan, 好克癌 | 靜脈 | 血球低下、噁心、嘔吐、貧血、輕度尿蛋白、血尿、掉頭、皮膚疹、水腫。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.補充足夠水分。 4.觀察排尿情形，困難解尿、頻尿或出血性膀胱炎的發生，需立即就醫。 |
| L-Asparaginase 樂拿舒 | 靜脈 | 過敏性休克、胰臟炎、高血糖、噁心、嘔吐、腹痛、凝血功能異常。 | 1.注射前先做測試 2.血液學檢查 3.預防感染。 4.觀察胰臟炎症狀(噁心、嘔吐、發燒、劇烈腹痛，常會傳到背部) |
| Methotrexate, MTX | 靜脈/脊椎注射/口服 | 血球低下、黏膜炎、肝毒性、腎毒性、掉髮、發燒、腹瀉、腹痛等。備註：使用中、高劑量要監測血中藥物濃度與肝功能，並定時給予葉酸作為解毒劑。 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.口腔照護。 4.含葉酸的補充劑會影響藥效，避免未經醫療指示隨意服藥。 |
| Paratrexate, 服瘤停 | 靜脈 | 血球低下、腸胃粘膜炎、肝腎功能異常、皮膚反應 | 1.血液學檢查。 2.預防感染。 3.口腔照護。 4.含葉酸的補充劑會影響藥效，避免未經醫療指示隨意服藥。 5.嚴重皮膚反應：皮疹、脫皮、潰瘍、水泡，請立刻就醫。 |
| Prednisolone 類固醇 | 靜脈/脊椎注射/口服 | 食慾不振、胃潰瘍、高血糖、睡眠障礙、毛囊炎。 高劑量或長期使用：外觀改變、月亮臉、水牛肩、青春痘、骨質疏鬆、皮膚變薄、容易感染等。 | 1.不同治療期使用不同種類的類固醇。 2.預防感染 3.避免空腹服用。 4.胃痛、解黑便或血便、發燒須就醫。 5.切勿自行停藥或調整劑量。 |