

台灣女性『子宮頸癌認知調查』公佈

報告人：

財團法人台灣癌症基金會執行長 賴基銘

子宮頸癌與子宮頸癌預防六大迷思

早期子宮頸癌，有警示症狀可循嗎？

「子宮頸癌只要發現得早就能**100%**治癒」嗎？

到底應該何時做抹片呢？

只要定期做子宮頸抹片檢查就能預防子宮頸癌嗎？

子宮頸癌元兇為何？

不論感染到哪一種類型的**HPV**病毒都有可能導致子宮頸癌嗎？

壹、研究方法及目的

調查對象：設籍台澎金馬，年滿16歲以上的女性。

調查方式：電話訪問調查方式。

調查時間：民國95年8月25日(星期五)至民國95年8月30日(星期三)。

成功樣本數：總計完成有效樣本1,081份


抽樣誤差：以百分之九十五信賴度估計，抽樣誤差在 $\pm 2.97\%$ 之內。

*調查機構:全國公信力民意調查股份有限公司


研究方法及目的（續）

- 藉由本認知調查，期能達到下列目的：
 - （一）了解女性國人對於「子宮頸癌」之認知程度
 - （二）進一步了解目前女性在「子宮頸癌預防觀念」上是否充足
 - （三）了解受訪者個人行為，探討初次性行為年齡與首次抹片檢查年齡間的關係
-

受訪者年齡層分佈圖




受訪者居住地分佈圖



貳、調查結果分析


一、你認為哪種癌症是女性癌症好發率最高的癌症？



『子宮頸癌』及『乳癌』仍是女性印象中最容易發生的癌症種類，但超過一半的人忽略子宮頸癌為好發率最高的癌症

調查結果分析 (續)


二、你認為哪種癌症是女性癌症死亡原因的第一位？



4成受訪者誤認『子宮頸癌』是女性癌症死亡原因最高之癌症，顯示有極大錯誤的認知，實質上也反應女性對子宮頸癌還是存有一定的恐懼，此外對排名第一及第二的肺癌及肝癌，卻毫無所悉

調查結果分析 (續)


三、你認為30歲以下女性是否需要擔心子宮頸癌問題？



8成受訪者觀念是正確的；同時也發現16-29歲的受訪者中，超過9成認知正確，顯示年輕族群更重視及擔心子宮頸癌對健康的威脅。

調查結果分析 (續)


四、你認為只有多重性伴侶的女性才會得到子宮頸癌？



超過7成受訪者有正確認知，但對年齡較大者(超過50歲)，具備正確觀念者降至僅五成左右

調查結果分析 (續)


五、你認為造成子宮頸癌之元兇為何？



不到3成的受訪者清楚知道造成子宮頸癌的真正元兇，顯示對子宮頸癌的發生有待教育的加強

調查結果分析（續）


六、你知道子宮頸癌分成『原位癌』及『侵襲癌』嗎？



近7成受訪者不知道子宮頸癌還有原位癌的早期病變，可能因此錯失100%治癒的機會。同時發現，自己或家人曾罹患子宮頸癌者，瞭解的比率提升。

調查結果分析(續)

七、對子宮頸癌症狀的認知狀況




子宮頸癌會造成上述症狀，但發生上述症狀不一定代表罹患子宮頸癌。

僅1成3受訪者知道子宮頸原位癌是無症狀的，易忽略原位癌的存在，而忘了無症狀時就要定期檢查以提早偵測早期子宮頸癌的存在。

調查結果分析(續)


八、「子宮頸癌只要提早發現就能100%治癒」對嗎？



**超過7成5受訪者認為子宮頸癌能被100%治癒！
但仍有1/4的人不知道**

調查結果分析(續)


九、你認為不論感染到哪種類型的**人類乳突病毒(HPV)**，都有可能導致子宮頸癌嗎？



仍然有超過**6成5**受訪者不清楚子宮頸癌與**HPV**感染之間的關係；對於致癌型(高危險)**HPV**與低危險**HPV**之認知教育仍需加強

調查結果分析(續)


十、只要定期做子宮頸抹片檢查，就可預防子宮頸癌？



超過7成受訪者認為定期子宮頸抹片可以預防子宮頸癌；但自己或家人曾罹患子宮頸癌之受訪者，卻有四成不認為如此，顯然信心不足

調查結果分析 (續)


十一、你認為應該從何時開始做子宮頸抹片檢查？



只有四成受訪者認為在初次性行為後就應開始抹片檢查的正確觀念，
卻有近一半的人認知不足

調查結果分析(續)


十二、請問你第一次性行為發生在幾歲的時候？



超過7成受訪者，初次性行為發生在15~29歲之間

調查結果分析(續)

十三、請問你幾歲的時候第一次做子宮頸抹片檢查？



在29歲以前開始子宮頸抹片檢查者，卻不到2成

調查結果分析(續)

十四、初次性行為與首次子宮頸抹片時間差

只有4成具有『初次性行為後就應開始抹片檢查』的正確觀念
超過7成受訪者，初次性行為發生在15~29歲之間
不到2成受訪者表示在29歲以前第一次接受子宮頸抹片檢查



觀念與行動間的矛盾 - 雖然認為初次性行為後就應進行抹片檢查，然而真正落實的比例偏低！

- 健保目前提供30歲以上婦女一年一次免費抹片，也會影響民眾就醫習慣

參、結論

- 超過一半的人不知子宮頸癌為女性好發率最高的癌症
 - 4成受訪者誤認子宮頸癌是女性癌症死亡原因最高之癌症，對排名第一及第二的肺癌及肝癌，卻毫無所悉
 - 年輕族群(16-29歲)超過9成重視及擔心子宮頸癌對健康的威脅
 - 近7成受訪者不知道子宮頸癌還有原位癌的早期病變，可能因此錯失 100%治癒的機會
 - 有1/4的人不知道子宮頸癌只要提早發現就能100%治癒
 - 僅1成3受訪者知道子宮頸原位癌是無症狀的，而忘了無症狀時就要定期檢查以提早偵測早期子宮頸癌的存在
-

結論(續)

- 不到三成的受訪者瞭解子宮頸癌是由**HPV**所引起，顯示對子宮頸癌發生的教育有待加強
 - 高達六成的受訪者不瞭解在發生初次性行為之後，就可以開始定期抹片檢查
 - 受訪者於**29**歲前發生初次性行為者佔七成以上，而於**29**歲前進行初次抹片檢查者卻不到兩成，顯示初次性行為與首次抹片間有時間落差
 - 第一次抹片檢查高峰年齡層出現在**35**歲以後，顯示與健保對**30**歲以上女性提供一年一次免費抹片篩檢之宣導有關
-

結論(續)

- 超過7成受訪者認為定期子宮頸抹片可以預防子宮頸癌；但自己或家人曾罹患子宮頸癌之受訪者，卻有四成不認為如此，顯然信心不足
 - 【子宮頸癌抹片檢查】若要達到預防子宮頸癌之目的，要能做到：1. 定期檢查，2. 優良採檢技術，3. 優良抹片染色技術，4. 優良判讀技術，5. 提早發現癌前病變
 - 要達到預防子宮頸癌，除定期子宮頸抹片檢查之外，應注意其他子宮頸癌危險因子的發生，如致癌型人類乳突病毒(HPV)感染
 - 人類乳突病毒疫苗問世將帶給女性預防子宮頸癌另一線希望
-